



BADANIE ENDOSKOPOWE DOLNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO

1. Badanie wykonuje się po odpowiednim przygotowaniu, polegającym na oczyszczeniu z resztek pokarmowych jelita, najczęściej za pomocą doustnie podawanych środków przeczyszczających, wspomaganym przez wlewy lub wlewki doodbytnicze. Przygotowanie rozpoczyna się w przeddzień badania.
2. Badanie wykonywane jest przy zastosowaniu giętkiego kolonoskopu, który wprowadza się przez odbył do jelita grubego. W razie potrzeby pobiera się ze zmian chorobowych wycinki do oceny histopatologicznej. Badanie trwa kilka minut.
3. **Możliwe powikłania:**
Powikłania zdarzają się niezmiernie rzadko, jednak powodzenia i absolutnego bezpieczeństwa tego badania nie jest w stanie zagwarantować żaden lekarz. Wyjątkowo zdarzyć się może przedziurawienie ściany przewodu pokarmowego lub krwawienie wymagające pilnego leczenia operacyjnego. Bardzo rzadko dochodzi do objawów ze strony innych narządów w postaci zaostrzenia istniejących chorób serca, płuc lub neurologicznych.
4. **ANKIETA DLA PACJENTA**
Aby ograniczyć do minimum występowanie w/w powikłań, prosimy o odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie:
 - a) Czy występowała u Pani/Pana zwiększona skłonność do krwawienia, zwłaszcza po drobnych skaleczeniach, po usunięciu zębów, bądź do powstawania sińców po niewielkich urazach mechanicznych?
 TAK* NIE*
 - b) Czy podobne objawy występowały wśród członków Pana/Pani rodziny?
 TAK* NIE*
 - c) Czy przyjmuje Pan/Pani leki powodujące „rozrzedzanie” krwi (np. Syncumar, Sintrom, Aspiryna)?
 TAK* NIE*
 - d) Czy występowały u Pani/Pana objawy uczulenia na leki lub środki spożywcze?
 TAK* NIE*
 - e) Czy choruje Pani/Pan na schorzenia związane z oczami (np. jaskrę)?
 TAK* NIE*

*Proszę zakreślić właściwą odpowiedź

UWAGA!

- Należy zaprzestać przyjmowania leków przeciwbólowych, szczególnie takich jak Aspiryna, Diclofenac, Ketoprofen, Meloksikam, czy Ibuprofen na 7 dni przed badaniem, ponieważ mogą one zwiększyć ryzyko wystąpienia krwawienia.
- W razie przyjmowania leków zmniejszających krzepliwość krwi (np. Acenocumarol, Sintrom, Ticlid, Aspiryna, Acard i inne) należy skonsultować się z lekarzem przed planowanym badaniem, ponieważ należy zaprzestać przyjmowania większości tych leków na kilka dni przed badaniem. Lekarz poinformuje w jaki sposób można zmodyfikować leczenie przeciwzakrzepowe.
- Jeśli choruje Pani/Pan na cukrzycę i przyjmuje Pani/Pan leki regulujące poziom stężenia glukozy we krwi, należy udać się do lekarza, który poinformuje w jaki sposób przyjmować leki przed badaniem.

Postępowanie po badaniu

- Jeśli przeprowadzone zostało miejscowe znieczulenie, przez 2 godziny po badaniu nie należy nic jeść ani pić. W razie wystąpienia silnych bólów brzucha lub czarnego stolca po badaniu należy niezwłocznie zgłosić to pielęgniarsce lub lekarzowi. Do końca dnia, w którym zostało wykonane badanie nie wolno prowadzić samochodu ani obsługiwać innych pojazdów i maszyn mechanicznych.



ENKLAWA ZDROWIA

Tel. 662 939 118
www.enklawazdrowia.pl

ul. Sokola 50A
26-110 Skarżysko-Kamienna

Ja niżej podpisany

.....
Zostałem wyczerpująco poinformowany o moim schorzeniu i konieczności wykonywania kolonoskopii, płynących z tego korzyści oraz ewentualnych zagrażających mi powikłaniach. Pisemną informację na temat badania otrzymałem.

Wyrażam zgodę na wykonanie badania oraz wszelkie dodatkowe ewentualne zabiegi, w tym pobieranie wycinków do badania histopatologicznego, które podczas badania mogą okazać się konieczne.

Nie wyrażam zgody na badanie

Skarżysko-Kamienna dn.

Skarżysko-Kamienna dn.

.....
podpis pacjenta

.....
podpis pacjenta