



## BADANIE: KOLONOSKOPIA

### PRZYGOTOWANIE DO BADANIA Z PREPARATEM FORTRANS:

- 7 dni przed badaniem należy odstawić leki przeciwbólowe, szczególnie takie jak Aspiryna, Diclofenac, Ketoprofen, Meloksikam, czy Ibuprofen, ponieważ mogą one zwiększyć ryzyko wystąpienia krwawienia.
- 5 dni przed badaniem należy odstawić leki zmniejszające krzepliwość krwi (np. Acenocumarol, Sintrom, Ticlid, Aspiryna, Acard i inne). Należy skonsultować się z lekarzem, który poinformuje w jaki sposób można zmodyfikować leczenie przeciwzakrzepowe.
- 3 dni przed planowanym badaniem nie należy spożywać produktów bogatobłonnikowych, takich jak owoce i warzywa (zwłaszcza surowych, a także tych zawierających drobne pestki: winogrona, malin, porzeczek, truskawek, fig, kiwi, owoców granatu, pomidorów, ogórków itp.), pieczywo pełnoziarniste, buraki, mak czy siemię lniane.
- W dniu poprzedzającym badanie można zjeść tylko śniadanie, bez mleka, surowych owoców i warzyw ani napojów gazowanych. Można spożywać zupy w formie zmiksowanej (zupy krem), kisiele, budynie, serki homogenizowane bez dodatków. Inne napoje (takie jak klarowne rozcieńczone soki, słabe napary herbat, woda niegazowana) można pić w dowolnej ilości.
- W dniu poprzedzającym badanie, około godziny 15:00, zgodnie z instrukcją należy przygotować 4 litry roztworu FORTRANS, rozpuszczając każdą z saszetek w 1 litrze NIEGAZOWANEJ wody. Przygotowany roztwór należy wypić w ciągu 5-6 godzin. Smak roztworu można poprawić, dodając niewielką ilość soku z cytryny.
- **Od chwili wypicia pierwszej porcji roztworu FORTRANS nie należy nic jeść. Można pić dowolną ilość NIEGAZOWANEJ wody, najlepiej mineralnej.**
- Normalną reakcją na lek powinny być wypróżnienia, pod koniec treścią płynną. Wypróżnienia prawie czystą wodą oznaczają dobre przygotowanie do badania.
- Przed zastosowaniem preparatu FORTRANS prosimy o przeczytanie ulotki informacyjnej dołączonej do preparatu.
- W dniu badania nie można pić roztworu przeczyszczającego, nie należy przyjmować jakichkolwiek posiłków, można natomiast pić NIEGAZOWANĄ wodę do 6 godzin przed badaniem.
- Na badanie należy wybrać się z osobą towarzyszącą.
- Jeśli choruje Pani/Pan na cukrzycę i przyjmuje Pani/Pan leki regulujące poziom stężenia glukozy we krwi, należy udać się do lekarza, który poinformuje w jaki sposób przyjmować leki przed badaniem.