

PRZYGOTOWANIE DO KOLONOSKOPII PREPARATEM MOVIPREP/CLENSIA

Na 4 dni przed badaniem:

Zaprzestać przyjmowania preparatów żelaza (np. Hemofer, Sorbifer, Tardyferon) aż do dnia badania.

Na 3 dni przed badaniem:

Zaprzestać przyjmowania leków zawierających kodeinę i loperamid aż do dnia badania.

Na 2 dni przed badaniem:

Starać się wypić w ciągu doby co najmniej 2 litry płynów.

Nie spożywać w żadnej postaci warzyw, owoców ani pokarmów zawierających pestki i nasiona (w tym pieczywa!). Wyjątkiem są ziemniaki, biały ryż, klarowne soki, tofu.

Można jeść bez ograniczeń nabiał, jajka, mięso, ryby, białe pieczywo (bez ziaren ani maku), jasny makaron.

W dniu poprzedzającym badanie:

Przyjąć leki stosowane przewlekłe, o ile lekarz nie dał innych zaleceń.

Do godziny 16:00 dieta jak w dniu poprzednim. Po tej godzinie nie należy już nic jeść.

Wieczorne dawki leków należy przyjąć nie później niż godzinę przed rozpoczęciem picia preparatu Moviprep/Cleusia.

Około godziny 21:00 przygotować roztwór preparatu Moviprep/Cleusia-według instrukcji dołączonej do opakowania. Po rozpuszczeniu proszków można roztwór nieco schłodzić.

Wypić sporządzony roztwór w tempie około 1 szklanki co 15 minut. Dodatkowo należy wypić 1/2 litra klarownych płynów (herbata, klarowne soki, napoje niegazowane).

W dniu badania:

Przyjąć leki stosowane przewlekłe (o ile lekarz nie dał innych zaleceń) na godzinę przed rozpoczęciem picia preparatu Moviprep/Cleusia. **Nie należy przyjmować leków przeciwcukrzycowych!**

Na 4 godziny przed badaniem wypić roztwór Moviprep/Cleusia w tempie około 1 szklanki co 15 minut. Dodatkowo należy wypić 1/2 litra klarownych płynów (herbata, klarowne soki, napoje niegazowane).

Na 2 godziny przed badaniem nie należy już nic jeść ani pić!